

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 11-6-70 071004

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC
(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

Boîte Postale 1078 - 34 MONTPELLIER

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 francs
N° II7 - JUIN 1970/2I
I° supplément

POMMIER

Araignée rouge (Panonychus ulmi) - Tavelure

Les populations d'Araignées rouges se développent rapidement et, dans certains vergers, ont atteint une densité qui nécessite un traitement spécifique. Avant d'appliquer ce traitement il faut s'assurer qu'il se justifie.

La Tavelure est apparue depuis quelque temps dans les vergers non protégés. Des contaminations ayant pour origine, d'une part les taches sur les feuilles et d'autre part les périthèces fournis sur les feuilles mortes (végétation de 1969), se produiront dès les prochaines pluies. Il est recommandé d'effectuer une pulvérisation à l'aide d'un fongicide.

La lutte contre l'Oïdium doit être poursuivie.

M. BEZUT

Ministère de l'Agriculture
Station Régionale d'Alertes
Viticoles
Ecole Nationale Supérieure Agronomique
de MONTPELLIER

Montpellier le 9 juin 1970

NOTE : 5

VERS DE LA GRAPPE

Le grand nombre de chenilles de première génération qui est observé dans plusieurs régions conduit à recommander l'exécution immédiate d'un traitement curatif avec un ester phosphorique acaricide.

Le Directeur de la Station Régionale
d'Alertes Viticoles :

J. BRANAS

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Tirage du 9 Juin 1970